

OPIČÍ NEŠTOVICE



PŘÍZNAKY:



ZVĚTŠENÍ
LYMFATICKÝCH
UZLIN

Opičí neštovice způsobují na rozdíl od planých neštovic otoky lymfatických uzlin.



BOLESTI ZAD A
SVALŮ



BOLEST HLAVY



VYSOKÁ
HOREČKA



VYRÁŽKA
V OBLASTI
GENITÁLIÍ


Opičí neštovice jsou charakteristické vyrážkou, která často začíná v oblasti genitálií nebo na místě primární infekce a postupně se rozšíří na další části těla.



VYRÁŽKA
NA RUKOU



VYRÁŽKA
NA NOHOU



NEŠTOVICE
Puchýřek
naplněný čirou
tekutinou.



5-21

DNÍ
INKUBAČNÍ DOBA



2-4


TÝDNY
TRVA NEMOC

PŘENOS Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA:

- Blízkým fyzickým kontaktem
- Sexuální aktivitou s nakaženým nebo s tělními tekutinami nakaženého
- Kontaminovanými předměty a plochami (oblečení, ložní prádlo, apod.)

CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ:

- Vyhněte se blízkému fyzickému kontaktu a sexuální aktivitě s nakaženým
- Dodržujte základní hygienická opatření
- Použití kondomu nemusí ochránit před nákazou opičích neštovic



MÁM PODEZŘENÍ NA NÁKAZU:

- Kontaktujte svého lékaře
- Izolujte se doma
- Chraňte ostatní a vyhněte se blízkému fyzickému kontaktu

OPIČÍMI NEŠTOVICEMI SE MŮŽE NAKAZIT KDOKOLIV!